

**Neue Beiträge zur Arthropodenfauna Norwegens  
- nebst gelegentlichen Bemerkungen über deutsche  
Arten. XV.**

Von

**Embrik Strand.**

(Berlin, Kgl. Zool. Museum.)

Inhalt.

XV. STRAND: Homoptera.

**XV. Homoptera.**

Von

**Embr. Strand.**

Die im folgenden verzeichneten Arten sind von Herrn Dr. L. MELICHAR (Brünn) bestimmt worden. Ausserdem ist eine s. Z. Herrn Dr. HORVATH zur Untersuchung vorgelegene Art hier mitbehandelt worden (cf. *Idiocerus*, p. 271). So gering wie die Anzahl der hier aufgeführten Arten auch ist, dürfte das Verzeichnis doch nicht wertlos sein, denn sowohl die deutsche als die norwegische Homopterenfauna ist noch sehr unvollständig bekannt. Nur drei der folgenden Lokalitäten, Marburg i. H., Hamburg und Stuttgart, sind deutsch, die andern norwegisch. — Herrn Dr. MELICHAR spreche ich auch an dieser Stelle meinen besten Dank aus.

Fam. *Cercopidæ*.

Gen. *Triecphora* AM. SERV.

*Triecphora vulnerata* ILLIG. Marburg 31. 5. 1904.

*Triecphora mactata* GERM. Marburg 12. 6. 1904.

Gen. *Lepyronia* AM. SERV.

*Lepyronia coleoptrata* L. Stuttgart Ende Aug. 1904.

Gen. *Aphrophora* GERM.

*Aphrophora alni* FALL. Marburg 26. 6. u. 11. 7. 1904.

Gen. *Philaenus* STÅL.

*Philaenus campestris* FALL. Rörvik, Vikten, unter Steinen auf trockenem Boden 9. 8. 1903. — Marburg 2. 7. 1904.

*Philaenus spumarius* L. Hamburg. Marburg 16. 7. — Solum, Overhalden 18. 8. 1903. Ranum ebenda, Aug. Brönnö unter Moos oder Steinen 5. 8. Trondhjem. Lårdal. — Var. *fasciatus* F. von Aal, Bergen, Tysfjorden und Lårdal.

*Philaenus spumarius* L. var. *lineatus* F. von Trondhjem, v. *marginellus* F. Lårdal, v. *lateralis* L. Aal, v. *leucophthalmus* L. Aal.

*Philaenus lineatus* L. Brönnö 5. 8. 1903; do. 4. 8. unter Steinen. Lårdal, Rörvik, Vikten 10. 8. 1903. — Marburg 3. 7. 1904.

Fam. *Membracidae*.Gen. *Centrotus* F.

*Centrotus cornutus* L. Marburg 29. 5. 1904. Larve ebenda 17. 7.

Gen. *Gargara* AM. SERV.

*Gargara genistae* F. Stuttgart. Marburg 26. 7.

Fam. *Jassidae*.Gen. *Ledra* F.

*Ledra aurita* L. Marburg 3. 7. 1904. Larve!

Gen. *Idiocerus* LEW.

*Idiocerus aaliensis* STRAND n. sp.

Von Aal in Hallingdal ist in meiner Sammlung ein *Idiocerus*-Weibchen vorhanden, das von HORVATH s. Z. als einer neuen Art wahrscheinlich angehörend bezeichnet wurde. Um die Kollegen auf diese Form aufmerksam zu machen und zu weiteren Nachforschungen anzuregen, gebe ich hier eine kurze Beschreibung und schlage den Namen *aaliensis* n. sp. vor.

Totallänge 6 mm. Graubräunlich, schwarz gefleckt, stellenweise olivenfarbig; Gesicht längs der Mitte hellgrünlich, Augen grauschwarz, zwischen denselben auf dem Scheitel eine schwärzliche, zwei, oder wenn man will, vier undeutlich hellere Querflecke einschliessende verwischte Querbinde. Pronotum zeigt jederseits Andeutung eines helleren, dunkler umrandeten Fleckchens; die Mitte ist der Länge nach ein wenig heller. Scutellum braungelblich, in der Mitte mit undeutlich dunklerer Mittellängsfigur, die beiden Basalecken durch je einen tiefschwarzen, den Seitenrand nicht ganz erreichenden Fleck bezeichnet. Auf den Flügeln herrscht die schwärzliche Färbung vor, am Rande und hinten erscheinen sie jedoch graugelblich und durchschimmernd; am Innenrande, am Ende des basalen Drittels dieses Randes, ist ein beiden Flügeln gemeinsamer, weisslicher, verwischter Fleck; braungelbliche Wische sind vorn und zwar seitwärts am deutlichsten. Beine rötlich braungelb, die Hintertibien fein schwarz gefleckt. Bauchseite des Körpers wie die Beine gefärbt, die Segmentränder weisslich.

Kopf und Thorax fast matt, die Flügel ziemlich stark glänzend. Unter der Lupe zeigen weder Stirn noch Scheitel auffallende strukturelle Merkmale.

*Idiocerus confusus* FLOR. Lærdal.

*Idiocerus populi* L. Trondhjem, Lærdal, Aal, Bergen.

#### Gen. *Bythoscopus* GERM.

*Bythoscopus alni* SCHRK. Lærdal, Lavik.

*Bythoscopus flavicollis* L. Tystfjorden, Lærdal.

Gen. *Agallia* CURT.

*Agallia venosa* FALL. Marburg November 1903. — Aal.

Gen. *Acocephalus* GERM.

*Acocephalus nervosus* SCHRK. Lavik, Lærdal, Bergen, Aal.

*Acocephalus bifasciatus* L. Lillehammer.

*Acocephalus albifrons* L. Bergen, Trondhjem, Lavik, Lærdal.

Gen. *Deltocephalus* BURM.

*Deltocephalus pallens* ZETT. Tysfjorden. Hatfjelddalen.  
Trondhjem.

*Deltocephalus striatus* L. Aal.

*Deltocephalus Flori* FIEB. Tysfjorden. Hatfjelddalen.

*Deltocephalus nigrifrons* KBM. Mo in Ranen 17. 7. 1903.

*Deltocephalus pulicaris* FALL. Aal. Lærdal.

*Deltocephalus abdominalis* F. Snemyr, Nordreisen 12. 8. 1901. Tysfjorden. Rös vand. Hatfjelddalen 16. 7. 1899. Skarmodalen. Bjöberg (Hemsedalsfjeld). Aal.

Gen. *Jassus* F.

*Jassus mixtus* F. Lærdal.

Gen. *Athysanus* BURM.

*Athysanus grisescens* ZETT. Tysfjorden.

*Athysanus brevipennis* KBM. Bjöberg auf Hemsedalsfjeld, Aal, Dönnä (Helgeland).

Gen. *Thamnotettix* ZETT.

*Thamnotettix simplex* H.-SCH. Tysfjorden, Hatfjelddalen. Hammerö. Lödingen. Rös vand. Skarmodalen. Lavik. — Von Tysfjorden und Hatfjelddalen liegt eine Varietät vor: die Rücken-  
seite des Körpers vor den Flügeln rot oder rötlich, auch das Gesicht meistens rot, bisweilen der ganze Kopf. Die Grösse scheint durchgehends ein wenig geringer zu sein. Die Flügel wie bei den dunkleren Exemplaren der Hauptform. Nenne diese Varietät *rufescenticeps* STRAND n. v. (Type von Hatfjelddalen).

*Thamnotettix sulphurellus* ZETT. Trondhjem. Lavik. Bergen.

*Thamnotettix fuscus* FALL. Hammerö. Tysfjorden.

*Thamnotettix cruentatus* F. Aal.

*Thamnotettix subfuscus* FALL. Tysfjorden, Hammerö, Lödingen, Rös vand, Klovimoen in Vefsen, Hatfjelddalen, Dalen in Hatfjelddalen, Hadsel, Aal, Botne, Porsgrund, Kristiania.

*Thamnotettix 4-notatus* F. Brekkesätren, Tönsät 30. 8. 1903. Aal. Lærdal. Bergen.

Gen. *Cicadula* ZETT.

*Cicadula sexnotata* FALL. Hatfjelddalen 14. 7. 1899.

Gen. *Gnathodus* FIEB.

*Gnathodus punctatus* THUNBG. Hvaløerne, Kristiania, Onsö, Skæen, Lavik. — Var. *rufescens* MEL. Lærdal.

Gen. *Chlorita* FIEB.

*Chlorita flavescens* F. Porsgrund.

Gen. *Empoasca* WALSH.

*Empoasca smaragdula* FALL. v. *rufescens* MEL. Hatfjelddalen. Rös vand. Trondhjem. Aal. Lærdal.

Gen. *Eupteryx* CURT.

*Eupteryx Germari* ZETT. Bergen, Aal.

Gen. *Typhlocyba* GERM.

*Typhlocyba sexpunctata* FALL. Aal, Lærdal.

*Typhlocyba geometrica* SCHRK. Lærdal.

Fam. *Fulgoridae*.

Gen. *Cixius* LATR.

*Cixius cunicularius* L. Kaafjord, Finmarken. Nordreisen.

*Cixius pilosus* OL. Marburg 28. 5. 1904.

Gen. *Tettigometra* LATR.

*Tettigometra obliqua* PANZ. Marburg S. 6. 1904.

Gen. *Stenocranus* FIEB.

*Stenocranus lineola* GERM. Marburg 1. 4. 1904. Stuttgart  
Ende August.

Gen. *Conomelus* FIEB.

*Conomelus limbatus* F. Marburg.

Gen. *Liburnia* STAL.

*Liburnia striatella* FALL. Marburg. Stuttgart.

*Liburnia sordidula* STAL?? Marburg 26. 7. 1904.